УДК 502.4:581.9(470.620) DOI: 10.14258/pbssm.2026042

Весенняя флора памятника природы «Парк Солнечный остров» (г. Краснодар)

Spring Flora of the Sunny Island Park Nature Monument (Krasnodar)

Гончаров А. Н.

Goncharov A. N.

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия. E-mail: andrey.goncharov.02@yandex.ru
Kuban State University, Krasnodar, Russia

Реферат. В статье рассматриваются результаты исследования весеннецветущей флоры одной из крупнейших ООПТ города Краснодара – памятника природы «Парк Солнечный остров». Полевые исследования проводились маршрутным методом, также проведён анализ материалов Научного гербария кафедры биологии и экологии растений КубГУ. По результатам работы составлен конспект, включающий 98 видов, подвидов и искусственных гибридов цветковых растений, относимых к 73 родам, 35 семействам и 23 порядкам. При составлении конспекта учитывались жизненные формы, ареал обитания, условия местообитания и частота встречаемости. Крупнейшим порядком является Rosales (15 видов), к нему же относится и крупнейшее семейство Rosaceae (12 видов). Крупнейшим является род *Acer* (7 видов). Среди жизненных форм преобладают многолетние травянистые растения (31 вид) и деревья (31 вид), что составляет 63,26 %. В целом отмечается преобладание фанерофитов (43 вида). Значительную часть изученной флоры составляют интродуценты – 16 видов (16,33 %). Также присутствует 2 искусственных гибрида. Всего выделено 17 географических элементов флоры Кавказа, ведущим из которых является кавказско-европейский (15 видов). В составе флоры имеется представитель охраняемой флоры Краснодарского края – *Cyclamen coum* subsp. *caucasicum* (K. Koch) O. Schwarz, небольшая популяция которого произрастает в центральной части парка.

Ключевые слова. Весенняя флора, географический анализ, геоэлементы, конспект флоры, Красная книга, Краснодар, ООПТ, памятник природы.

Summary. The article discusses the results of a study of the spring-flowering flora of one of the largest protected areas in the city of Krasnodar, the Sunny Island Park Nature Monument. The field research was conducted using the route method, and the materials of the Scientific Herbarium of the Department of Plant Biology and Ecology at Kuban State University were analyzed. The results of the study were summarized in a list of 98 species, subspecies, and artificial hybrids of flowering plants belonging to 73 genera, 35 families, and 23 orders. When compiling the abstract, the following were taken into account: life forms, habitat range, habitat conditions, and frequency of occurrence. The largest order is Rosales (15 species), which also includes the largest family, Rosaceae (12 species). The largest genus is *Acer* (7 species). Among the life forms, perennial herbaceous plants (31 species) and trees (31 species) predominate, accounting for 63,26 %. In general, phanerophytes (43 species) are predominant. Introduced species make up a significant part of the studied flora – 16 species (16.33 %). There are also 2 artificial hybrids. In total, 17 geographical elements of the Caucasian flora have been identified, with the Caucasian-European element being the most prominent (15 species). The flora includes a representative of the protected flora of the Krasnodar Territory, *Cyclamen coum* subsp. *caucasicum* (K. Koch) O. Schwarz, which has a small population in the central part of the park.

Key words. Flora summary, geoelements, geographical analysis, Krasnodar, natural monuments, protected areas, Red Book, spring flora.

Введение. Памятник природы регионального значения «Парк Солнечный остров» (ранее «Парк 40-лет Октября») был образован решением Советского райисполкома г. Краснодара от 26.08.1981 г. № 354. Современные границы были утверждены постановлением губернатора Краснодарского края от 31.03.2016 № 164. Целью создания ООПТ является сохранение зелёных насаждений и объектов, имеющих историческое, эстетическое, экологическое и культурное значение, создание благоприятной окружающей среды, экологическое просвещение и создание условий для отдыха населения. Современная площадь парка составляет 40,2988 га, из которых 10 га занимает «Сафари-парк». Возраст раститель-

ности составляет 100–150 лет. На самом берегу ерика «Казачьего», отделяющего Солнечный остров от острова Большого произрастает 5 больших деревьев дуба черешчатого, один из которых официально является памятником природы. Он известен как «Дуб Титан» (Памятник природы «Парк Солнечный остров». URL: https://www.uooptkk.ru/solnechniy-ostrov; Плотников, Сергеева, 2013).

Парк «Солнечный остров» является излюбленным местом отдыха жителей и гостей города. Также на территории парка проводятся экскурсии для студентов биологического факультета Кубанского государственного университета, которые проходят в рамках учебной практики по ботанике и зоологии во 2 и 4 семестрах. Данное исследование поможет будущим биологам глубже погрузиться в получение практических навыков, а всем интересующимся живой природой покажет флористическое разнообразие одного из крупнейших парков Краснодара.

Материал и методы. Полевые исследования проводились с февраля по май в 2025–2026 гг. традиционным маршрутным методом, с выходом на маршрут 1 раз в 2 недели. Также были изучены гербарные образцы Научного гербария кафедры биологии и экологии растений КубГУ. Для установления видовой принадлежности растений использовались общепринятые определители (Косенко, 1970; Зернов, 2006). Таксономическое положение видов дано согласно последней принятой системе классификации (APG IV, 2016). Актуальные латинские названия растений приведены согласно международной базе данных The Catalogue of Life (URL: https://www.catalogueoflife.org). При проведении географического анализа использовали систему географических элементов флоры Кавказа (Портениер, 2000). Для интродуцированных видов приведены естественные ареалы обитания.

Результаты и их обсуждение. В результате проведённых исследований составлен конспект весенней флоры, насчитывающий 98 наименований. Для каждого вида приведены латинское и русское научные названия, период цветения (месяц цветения обозначен римскими цифрами в скобках), жизненные формы, географический элемент или естественный ареал обитания, местообитание, частота встречаемости. При необходимости указаны синонимичные названия, ранее использовавшиеся в определителях и «флорах».

Конспект весенней флоры парка «Солнечный остров»

Клада Магнолииды Magnoliids

Порядок Перечноцветные Piperales Bercht. et J. Presl

Семейство Кирказоновые Aristolochiaceae Juss.

1. *Aristolochia clematitis* L. – кирказон ломоносовидный (V). Многолетнее травянистое растение, криптофит. Субсредиземноморский элемент. Вдоль дорог. Нечасто.

Порядок Магнолиецветные Magnoliales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Семейство Магнолиевые Magnoliaceae Juss.

2. *Magnolia liliiflora* Desr. – магнолия лилиецветная (IV). Кустарник, фанерофит. Интродуцент (Юго-Восточный Китай). В озеленении. Единично.

Клада Однодольные Monocots

Порядок Частухоцветные Alismatales R. Br. ex Bercht. et J. Presl

Семейство Ароидные Araceae Juss.

3. *Arum italicum* Mill. – аронник итальянский (IV). Многолетнее травянистое растение, криптофит. Средиземноморский элемент. В лесной зоне. Часто.

Порядок Спаржецветные Asparagales Link

Семейство Касатиковые Iridaceae Juss.

4. *Iris pseudacorus* L. – касатик ложноаировый (V). Многолетнее травянистое растение, криптофит. Западно-палеарктический элемент. По берегам водоёмов. Нечасто.

Семейство Спаржевые Asparagaceae Juss.

5. *Scilla siberica* Andrews – пролеска сибирская (III). Многолетнее травянистое растение, криптофит. Восточно-субсредиземноморский элемент. В лесной зоне. Небольшая популяция в юго-западной части парка.

Порядок Злакоцветные Poales Small

Семейство Осоковые Cyperaceae Juss.

6. *Carex hirta* L. – осока коротковолосистая (IV). Многолетнее травянистое растение, гемикриптофит или криптофит. Кавказско-европейский элемент. Вдоль дорог. Часто.

7. *Carex acutiformis* Ehrh. – осока островатая (IV). Многолетнее травянистое растение, гемикриптофит или криптофит. Плюрирегиональный элемент. По берегам водоёмов. Часто.

8. *Carex sylvatica* Huds. – осока лесная (IV). Многолетнее травянистое растение, гемикриптофит или криптофит. Западно-палеарктический элемент. В зарослях кустарников. Редко.
9. *Carex acuta* L. – осока острая (IV). Многолетнее травянистое растение, гемикриптофит. Евро-сибирский элемент. На влажных местах. Редко.
10. *Carex vulpina* L. – осока лисья (IV). Многолетнее травянистое растение, гемикриптофит или криптофит. Западно-палеарктический элемент. На влажных местах. Часто.
11. *Carex divulsa* Stokes – осока прерванная (III–IV). Многолетнее травянистое растение, гемикриптофит или криптофит. Средиземноморский элемент. В зарослях кустарников. Единично.

Семейство Мятликовые Poaceae Barnhart

12. *Hordeum murinum* subsp. *leporinum* (Link) Arcang. [*H. leporinum* Link] – ячмень заячий (V). Однолетнее травянистое растение, терофит. Общедревнесредиземноморский элемент. В составе сухих луговых сообществ. Часто.
13. *Bromus diandrus* Roth [*Anisantha diandra* (Roth) Tutin] – костёр двутычинковый (V). Однолетнее травянистое растение, терофит. Средиземноморский элемент. В составе луговых сообществ. Часто.
14. *Poa pratensis* L. – мятлик луговой (IV–V). Многолетнее травянистое растение, гемикриптофит. Плюрирегиональный элемент. Вдоль дорог. Часто.
15. *Poa annua* L. – мятлик однолетний (IV). Однолетнее или двулетнее травянистое растение, терофит или гемикриптофит. Плюрирегиональный элемент. В составе луговых сообществ. Часто.
16. *Poa compressa* L. – мятлик сплюснутый (III–IV). Многолетнее травянистое растение, криптофит. Южно-палеарктический элемент. Вдоль дорог. Нечасто.
17. *Dactylis glomerata* L. – ежа сборная (IV–V). Многолетнее травянистое растение, криптофит. Евро-сибирский элемент. В составе луговых сообществ. Часто.

Клада Высшие настоящие двудольные Eudicots

Порядок Лютикоцветные Ranunculales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Семейство Маковые Papaveraceae Juss.

18. *Chelidonium majus* L. – чистотел большой (IV–V). Многолетнее травянистое растение, гемикриптофит. Палеарктический элемент. В лесной зоне. Часто.
19. *Corydalis cava* (L.) Schweigg. et Körte [*C. marschalliana* (Pallas ex Willd.) Pers.] – хохлатка полая (III–IV). Многолетнее травянистое растение, криптофит. Кавказско-европейский элемент.

Семейство Лютиковые Ranunculaceae Juss.

20. *Ranunculus repens* L. – лютик ползучий (IV–V). Многолетнее травянистое растение, гемикриптофит. Палеарктический элемент. В составе луговых и лесных сообществ. Часто.
21. *Ficaria verna* Huds. [*Ranunculus ficaria* L. s.l] – чистяк весенний (II–IV). Многолетнее травянистое растение, криптофит. Западно-палеарктический элемент. В составе лесных сообществ. Часто.

Порядок Протеецветные Proteales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Семейство Платановые Platanaceae T. Lestib.

22. *Platanus orientalis* L. – платан восточный (V). Дерево, фанерофит. Восточно-субсредиземноморский элемент. В озеленении. Часто.

Порядок Бобовоцветные Fabales Bromhead

Семейство Бобовые Fabaceae Lindl.

23. *Cercis siliquastrum* L. – багрянник европейский (IV–V). Дерево, фанерофит. Восточно-субсредиземноморский элемент. В озеленении. Редко.
24. *Gleditsia triacanthos* L. – гледичия трёхколючковая (V). Дерево, фанерофит. Интродуцент (Северная Америка). В лесной зоне и в составе аллей. Нечасто.
25. *Medicago lupulina* L. – люцерна хмелевидная (V). Однолетнее или малолетнее травянистое растение, терофит или гемикриптофит. Плюрирегиональный элемент. Вдоль дорог. Часто.
26. *Medicago sativa* L. – люцерна посевная (V). Многолетнее травянистое растение, криптофит. Общедревнесредиземноморский элемент. Вдоль дорог. Редко.
27. *Trifolium pratense* L. – клевер луговой (V). Многолетнее травянистое растение, гемикриптофит. Палеарктический элемент. В составе луговых сообществ. Часто.
28. *Trifolium repens* L. – клевер ползучий (V). Многолетнее травянистое растение, гемикриптофит. Плюрирегиональный элемент. В составе луговых сообществ. Часто.
29. *Robinia pseudoacacia* L. – робиния ложная акация (V). Дерево, фанерофит. Интродуцент (Северная Америка). В лесной зоне и в составе аллей. Часто.

30. *Caragana arborescens* Lam. – карагана древовидная (IV–V). Кустарник, фанерофит. Интродуцент (Центральная Азия, Сибирь, Дальний Восток). В озеленении. Редко.
31. *Vicia grandiflora* Scop. – горошек крупноцветковый (IV). Однолетнее травянистое растение, терофит. Восточно-субсредиземноморский элемент. Вдоль дорог. Редко.
32. *Vicia sativa* L. – горошек посевной (V). Однолетнее травянистое растение, терофит. Плюрирегиональный элемент. Вдоль дорог. Нечасто.

Порядок Розоцветные Rosales Bercht. et J. Presl

Семейство Rosaceae Juss.

33. *Spiraea* × *vanhouttei* (Briot) Zabel – спирея Вангутта (V). Кустарник, фанерофит. Искусственный гибрид. В зарослях кустарников. Единично.
34. *Spiraea prunifolia* Siebold et Zucc. – спирея сливолистная (III–IV). Кустаринк, фанерофит. Интродуцент (Южный Китай, Корея). В озеленении. Единично.
35. *Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach – айвочка японская (III–IV). Кустарник, фанерофит. Интродуцент (Центральная Корея, Япония). В озеленении. Единично.
36. *Cydonia oblonga* Mill. – айва продолговатая (III–IV). Дерево, фанерофит. Кавказско-гирканский элемент. В составе аллей. Редко.
37. *Pyrus calleryana* Decne. – груша Каллери (III–IV). Дерево, фанерофит. Интродуцент (Юго-Восточная Азия). В озеленении. Единично.
38. *Malus domestica* (Suckow) Borkh. [*M. niedzwetzkyana* Dieck ex Koehne] – яблоня домашняя (IV). Дерево. Фанерофит. Интродуцент (Центральная Азия). В озеленении. Единично
39. *Crataegus monogyna* Jacq. – боярышник однопестичный (IV–V). Дерево, фанерофит. Кавказско-европейский элемент. В лесной зоне. Единично.
40. *Geum urbanum* L. – гравилат городской (V). Многолетнее травянистое растение, гемикриптофит. Западно-палеарктический элемент. В зарослях кустарников. Нечасто.
41. *Rosa canina* L. – шиповник собачий (V). Кустарник, фанерофит. Западно-палеарктический элемент. В зарослях кустарников. Нечасто.
42. *Prunus cerasus* L. – вишня обыкновенная (III–IV). Дерево, фанерофит. Кавказский элемент. В лесной зоне. Единично.
43. *Prunus cerasifera* Ehrh. – слива вишненосная, алыча (III–IV). Дерево, фанерофит. Понтическо-южносибирский элемент. Вдоль дорог, в лесной зоне и в составе аллей. Часто.
44. *Prunus armeniaca* L. – абрикос (III). Дерево, фанерофит. Интродуцент (Центральная Азия, Китай). В лесной зоне. Нечасто.

Семейство Вязовые Ulmaceae Mirb.

45. *Ulmus glabra* Huds. – вяз шершавый (II–III). Дерево, фанерофит. Западно-палеарктический элемент. В лесной зоне. Нечасто.
46. *Ulmus minor* Mill. – вяз малый (II–III). Небольшое дерево или крупный кустарник, фанерофит. Общедревнесредиземноморский элемент. В лесной зоне. Нечасто.

Семейство Тутовые Moraceae Gaudin

47. *Morus nigra* L. – шелковица чёрная (IV–V). Дерево, фанерофит. Интродуцент (Западный Иран). В лесной зоне. Часто.

Порядок Букоцветные Fagales Engl.

Семейство Буковые Fagaceae Dumort.

48. *Quercus robur* L. – дуб черешчатый (V). Дерево, фанерофит. Кавказско-европейский элемент. На аллеях. Часто.

Семейство Ореховые Juglandaceae DC. ex Perleb

49. *Juglans regia* L. – орех грецкий (IV–V). Дерево, фанерофит. Ирано-туранский элемент. В лесной зоне. Часто.
50. *Juglans nigra* L. – орех чёрный (V). Дерево, фанерофит. Интродуцент (Северная Америка). В лесной зоне и на аллеях. Часто.

Семейство Берёзовые Betulaceae Gray

51. *Carpinus betulus* L. – граб обыкновенный (IV). Дерево, фанерофит. Кавказско-европейский элемент. На аллее. Единично.
52. *Betula pendula* Roth – берёза повислая (IV). Дерево, фанерофит. Голарктический элемент. В лесной зоне и на аллеях. Часто.

53. *Alnus* × *pubescens* Tausch [*A. barbata* C. A. Meyer] – ольха пушистая (III). Дерево, фанерофит. Интродуцент (Северо-Западная Европа, Северо-Запад России). В лесной зоне. Нечасто.

Порядок Кисличноцветные Oxalidales Bercht. et J. Presl

Семейство Кисличные Oxalidaceae R. Br.

54. *Oxalis stricta* L. – кислица прямая (V). Двулетнее или многолетнее травянистое растение, криптофит. Интродуцент (Япония, Китай, Северная Америка). На сорных местах. Редко.

Порядок Мальпигиецветные Malpighiales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Семейство Фиалковые Violaceae Batsch

55. *Viola odorata* L. – фиалка душистая (II–IV). Многолетнее травянистое растение, гемикриптофит. Кавказско-европейский элемент. В лесной зоне. Часто.

Семейство Ивовые Salicaceae Mirb.

56. *Salix fragilis* L. – ива ломкая (III–IV). Небольшое дерево, фанерофит. Интродуцент (Турция). По берегам водоёмов. Часто.

57. *Salix babylonica* L. – ива вавилонская (III–IV). Дерево, фанерофит. Интродуцент (Северо-Восток Китая, Корея). На влажных местах. Нечасто.

58. *Populus alba* L. – тополь белый (III). Дерево, фанерофит. Западно-палеарктический элемент. На влажных местах. Часто.

Порядок Гераниецветные Geraniales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Семейство Гераниевые Geraniaceae Juss.

59. *Geranium columbinum* L. – герань голубиная (V). Однолетнее или двулетнее травянистое растение, терофит или гемикриптофит. Кавказско-европейский элемент. В составе луговых сообществ. Редко.

Порядок Сапиндоцветные Sapindales Juss. ex Bercht. ex J. Presl

Семейство Сапиндовые Sapindaceae Juss.

60. *Acer platanoides* L. – клён платановидный (IV). Дерево, фанерофит. Кавказско-европейский элемент. В лесной зоне и в составе аллей. Часто.

61. *Acer saccharinum* L. – клён серебристый (II–III). Дерево, фанерофит. Интродуцент (Северная Америка). В составе аллей. Нечасто.

62. *Acer cappadocicum* Gled. [*A. laetum* C. A. Meyer] – клён каппадокийский (III). Дерево, фанерофит. Южно-палеарктический элемент. В составе аллей. Единично.

63. *Acer campestre* L. – клён полевой (IV). Дерево, фанерофит. Кавказско-европейский элемент. В лесной зоне. Единично.

64. *Acer tataricum* L. – клён татарский (III–IV). Кустарник, фанерофит. Южно-палеарктический элемент. В лесной зоне. Единично.

65. *Acer pseudoplatanus* L. – клён ложноплатановый (IV–V). Дерево, фанерофит. Субсредиземноморский элемент. В лесной зоне и в составе аллей. Часто.

66. *Acer negundo* L. – клён ясенелистный (III–IV). Дерево, фанерофит. Интродуцент (Северная Америка). В лесной зоне, вдоль дорог и по берегам водоёмов. Часто.

67. *Aesculus hippocastanum* L. – конский каштан обыкновенный (IV–V). Дерево, фанерофит. Интродуцент (Балканский полуостров, Турция). В составе аллей. Часто.

Порядок Капустоцветные Brassicales Bromhead

Семейство Капустные Brassicaceae Burnett

68. *Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara et Grande – чесночница черешчатая (III–V). Однолетнее травянистое растение, терофит. Западно-палеарктический элемент. В зарослях кустарников. Часто.

69. *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. – гулявник лекарственный (V). Однолетнее или двулетнее травянистое растение, терофит или гемикриптофит. Западно-палеарктический элемент. Вдоль дорог. Редко.

70. *Barbarea vulgaris* W. T. Aiton – сурепка обыкновенная (III–IV). Двулетнее травянистое растение, гемикриптофит. Южно-палеарктический элемент. В составе луговых сообществ. Нечасто.

71. *Cardamine hirsuta* L. – сердечник шершавый (III–IV). Однолетнее или двулетнее травянистое растение, терофит или гемикриптофит. Плюрирегиональный элемент. Вдоль дорог. Нечасто.

72. *Lepidium draba* L. [*Cardaria draba* (L.) Desv.] – клоповник крупковидный (V). Многолетнее травянистое растение, криптофит. Южно-палеарктический элемент. Вдоль дорог. Редко.

73. *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. – пастушья сумка обыкновенная (IV–V). Однолетнее травянистое растение, терофит. Палеарктический элемент. Вдоль дорог. Часто.

Порядок Гвоздичноцветные Caryophyllales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Семейство Гвоздичные Caryophyllaceae Juss.

74. *Rabelera holostea* (L.) M. T. Sharples et E. A. Tripp [*Stellaria holostea* L.] – рабелера ланцетолистная (IV). Многолетнее травянистое растение, криптофит. Западно-палеарктический элемент. В лесной зоне. Редко.

75. *Stellaria media* (L.) Vill. – звездчатка средняя (III–IV). Однолетнее травянистое растение, терофит. Плюрирегиональный элемент. В составе луговых сообществ и вдоль дорог. Часто.

76. *Cerastium nemorale* M. Bieb. – ясколка дубравная (IV). Однолетнее травянистое растение, терофит. Кавказско-европейский элемент. В составе луговых сообществ. Редко.

Порядок Кизилоцветные Cornales Link

Семейство Кизиловые Cornaceae Bercht. et J. Presl

77. *Cornus sanguinea* subsp. *australis* (C. A. Mey.) Jáv. [*C. australis* C. A. Mey.] – кизил южный (V). Кустарник, фанерофит. Европейско-средиземноморский элемент. В лесной зоне. Нечасто.

Порядок Верескоцветные Ericales Bercht. et J. Presl

Семейство Первоцветные Primulaceae Batsch ex Borkh.

78. *Cyclamen coum* subsp. *caucasicum* (K. Koch) O. Schwarz – цикламен кавказский (II–III). Многолетнее травянистое растение, криптофит. Эвксинский элемент. Имеется небольшая популяция в центральной части парка. Вид внесён в Красную книгу Краснодарского края (2017).

Порядок Горечавкоцветные Gentianales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Семейство Мареновые Rubiaceae Juss.

79. *Galium aparine* L. – подмаренник цепкий (IV–V). Однолетнее травянистое растение, терофит. Палеарктический элемент. В лесной зоне. Часто.

Семейство Кутровые Apocynaceae Juss.

80. *Periploca graeca* L. – обвойник греческий (V). Деревянистая лиана, фанерофит. Общедревнесредиземноморский элемент. В зарослях кустарников. Нечасто.

Порядок Яснoткоцветные Lamiales Bromhead

Семейство Маслиновые Oleaceae Hoffmanns. et Link

81. *Fraxinus excelsior* L. – ясень высокий (III–IV). Дерево, фанерофит. Кавказско-европейский элемент. В лесной зоне. Часто.

82. *Forsythia* × *intermedia* Zabel – форзиция промежуточная (III–IV). Кустарник, фанерофит. Искусственный гибрид. В озеленении. Единично.

Семейство Подорожниковые Plantaginaceae Juss.

83. *Veronica serpyllifolia* L. – вероника тимьянолистная (IV). Двулетнее или многолетнее травянистое растение, гемикриптофит. Голарктический элемент. В лесной зоне. Единично.

84. *Veronica persica* Poir. – вероника персидская (II–IV). Однолетнее или двулетнее травянистое растение, терофит или гемикриптофит. Кавказско-гирканский элемент. В составе луговых сообществ, вдоль дорог. Часто.

85. *Plantago lanceolata* L. – подорожник ланцетолистный (V). Многолетнее травянистое растение, гемикриптофит. Западно-палеарктический элемент. В составе луговых сообществ, вдоль дорог. Часто.

Семейство Яснотковые Lamiaceae Martinov

86. *Ajuga genevensis* L. – живучка женевская (V). Многолетнее травянистое растение, гемикриптофит. Кавказско-европейский элемент. В составе луговых сообществ. Имеется небольшая популяция в северо-западной части парка.

87. *Glechoma hederacea* L. – будра плющевидная (III–V). Многолетнее травянистое растение, гемикриптофит. Евро-сибирский элемент. На влажных местах в составе луговых сообществ. Часто.

88. *Lamium purpureum* L. – яснотка пурпурная (II–IV). Двулетнее или малолетнее травянистое растение, гемикриптофит. Евро-сибирский элемент. В составе луговых и лесных сообществ. Часто.

89. *Lamium maculatum* (L.) L. – яснотка крапчатая (III–V). Многолетнее травянистое растение, криптофит. Кавказско-европейский элемент. В лесной зоне. Часто.

Порядок Астроцветные Asterales Link

Семейство Астровые Asteraceae Dumort.

90. *Senecio vulgaris* L. – крестовник обыкновенный (II–V). Однолетнее травянистое растение, терофит. Палеарктический элемент. Вдоль дорог. Нечасто.

91. *Senecio vernalis* Waldst. et Kit. – крестовник весенний (IV–V). Однолетнее травянистое растение, терофит. Западно-палеарктический элемент. Вдоль дорог. Редко.
92. *Sonchus oleraceus* L. – осот огородный (V). Однолетнее травянистое растение, терофит. Западно-палеарктический элемент. Вдоль дорог. Нечасто.
93. *Lapsana communis* L. – бородавник обыкновенный (V). Однолетнее травянистое растение, терофит. Евро-сибирский элемент. В зарослях кустарников. Редко.
94. *Taraxacum officinale* Weber ex F. H. Wigg. – одуванчик лекарственный (III–V). Многолетнее травянистое растение, гемикриптофит. Евро-сибирский элемент. В составе луговых сообществ, вдоль дорог. Часто.

Порядок Ворсянкоцветные Dipsacales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Семейство Калиновые Viburnaceae Raf.

95. *Sambucus nigra* L. – бузина чёрная (V). Кустарник, фанерофит. Кавказско-европейский элемент. По берегам водоёмов. Единично.
96. *Viburnum opulus* L. – калина обыкновенная (V). Кустарник, фанерофит. Евро-сибирский элемент. В озеленении. Редко.

Семейство Жимолостные Caprifoliaceae Adans.

97. *Valeriana officinalis* L. – валериана лекарственная (V). Многолетнее травянистое растение, криптофит. Кавказско-европейский элемент. В лесной зоне. Нечасто.

Порядок Зонтикоцветные Apiales Nakai

Семейство Сельдерейные Apiaceae Lindl.

98. *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. – купырь лесной (IV–V). Двулетнее или многолетнее травянистое растение, гемикриптофит. Палеарктический элемент. В лесной зоне. Часто.

Заключение. Весенняя флора памятника природы «Парк Солнечный остров» насчитывает 98 видов, подвидов и гибридов из 73 родов, 35 семейств и 23 порядков цветковых растений. Крупнейшие порядки: Rosales (15 видов), Poales (12 видов) и Fabales (10 видов) составляют 37,76 % от общего числа видов. Крупнейшие семейства: Rosaceae (12 видов), Fabaceae (10 видов), Sapindaceae (8 видов). Крупнейшие рода: *Acer* (7 видов) и *Carex* (6 видов).

Среди жизненных форм преобладают многолетние травянистые растения (31 вид) и деревья (31 вид), что составляет 63,26 %. Менее всего представлены двулетние травянистые растения (5 видов) и деревянистые лианы (1 вид). Отмечается преобладание фанерофитов (43 вида).

В составе флоры выделено 17 географических элементов флоры Кавказа, ведущими из которых являются кавказско-европейский (15 видов) и западно-палеарктический (14 видов). Также значительную часть занимают интродуценты – 16 видов (16,33 %). По одному виду представлены европейско-средиземноморский, эвксинский, кавказский, понтическо-южносибирский и ирано-туранский геоэлементы.

ЛИТЕРАТУРА

Зернов А. С. Флора Северо-Западного Кавказа. – Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2006. – 664 с.

Косенко И. С. Определитель высших растений Северо-Западного Кавказа и Предкавказья. – Москва: Колос, 1970. – 613 с.

Красная книга Краснодарского края. Растения и грибы / отв. ред. С. А. Литвинская [и др.]. – Краснодар: Адм. Краснодар. края, 2017. – 850 с.

Памятник природы «Парк Солнечный остров». URL: https://www.uooptkk.ru/solnechniy-ostrov.

Плотников Г. К., Сергеева В. В. Леса и парки Кубани. – Краснодар: Традиция, 2013. – 180 с.

Портениер Н. Н. Система географических элементов флоры Кавказа // Ботанический журнал, 2000. – Т. 85, № 9. – С. 26–33.

An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV / J. W. Byng [et al.] // Botanical Journal of the Linnean Society, 2016. – № 181. – P. 1–20.

The Catalogue of Life. URL: https://www.catalogueoflife.org