

О НАХОЖДЕНИИ *CYPRIPEDIUM VENTRICOSUM* SW.
НА АЛТАЕ

ABOUT A FINDING *CYPRIPEDIUM VENTRICOSUM* SW.
ON ALTAI

Cypripedium ventricosum был описан О. Р. Swartz в 1800 году из Северной Европы одновременно с *C. macranthon*. R. Soo переводит *C. ventricosum* в ранг подвида *C. macranthon ssp. ventricosum (Sw.) Soo*.

П. Н. Крылов (1929) придерживался мнения Рейшенбаха и возводил *C. ventricosum* в ранг вариации *C. macranthon var. ventricosum (Swartz) Reichenb.* Он указывал его для окрестностей г. Томска и г. Тобольска. Г. А. Пешкова (1979) указывает на нахождение *C. macranthon ssp. ventricosum (Sw.) Soo* в окрестностях г. Иркутска.

При обработке рода *Cypripedium* во "Флоре Сибири" (Иванова, 1987) *C. ventricosum* был принят, по-видимому, как вариация или форма *C. macranthon* и в сводке не указан, так как в предисловии к этому изданию отмечается, что разновидности (*varietes*) и формы (*forma*) исключены из рассмотрения.

С. К. Черепанов (1995) приводит *C. ventricosum Sw.* как отдельный вид, встречающийся в Восточной Европе, Западной Сибири, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

На территории Горного Алтая нами были собраны несколько растений р. *Cypripedium* для посадки в Ботаническом саду. Сборы были сделаны в долине р. Катунь в окрестностях пос. Аскат в сосновом разнотравно-папоротниковом лесу, и в окрестностях с. Узнезя в сосново-березовом разнотравном лесу.

Часть растений была высажена в коллекции Е. Maier (Германия). В период цветения (Рис. 16) растения были идентифицированы как *C. ventricosum* и имели полное сходство с европейскими образцами этого вида. Отличия его от *C. macranthon* (Рис. 1а) состоят в следующем: губа равна или короче боковых листочков околоцветника, окраска цветков светлее, губа к основанию почти белая; верхние боковые листочки более узкие, боковые имеют волнистый край или заметно закручены; оторочка губы в два раза уже, чем у *C. macranthon*.

Трудность систематики этих видов при работе с гербарными образцами заключается в том, что при сушке цветы сильно деформируются и чернеют, поэтому трудно определить соотношение длины губы и листочков околоцветника, а так же идентифицировать первоначальную окраску губы.

Вопрос о распространении *C. ventricosum* на Алтае требует специального исследования и важную роль при этом сыграли бы наблюдения в природе непосредственно в период цветения.

ЛИТЕРАТУРА

- Флора Западной Сибири. - Томск, 1929. - Т. 3. - С. 377 - 718.
Флора Сибири. - Новосибирск, 1988. - Т. 1. - 247 с.
Флора Центральной Сибири. - Новосибирск, 1979. - Т. 1. - 534 с.
Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. - С.-Птб.,



Рис. 1. Внешний вид: а - *Cypripedium macranthon* , б - *C. ventricosum*

1995.- 990 c.

Soo R. Iconographia Orchideum Europaeum. - Berlin, 1935. - T. 2. - 311 P.

SUMMARY

Question on the independence *Cypripedium ventricosum* Sw. is considered.